

예방접종의 실시기준 및 방법 일부개정안

1. 개정이유 및 주요내용

예방접종전문위원회의 권고 및 국가예방접종사업 지원 대상 백신 항목 확대 등을 고려하여 소아 폐렴구균 예방접종을 정기에방접종에 포함하고자 함

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제32조
및 같은 법 시행규칙 제26조

나. 예산조치 : 기재부 협의 완료

다. 합 의 : 별도조치 필요 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨
2) 행정예고 : 2014. 4. 11 ~ 18
3) 규제심사 : 규제 신설·폐지 없음

보건복지부 고시 제2014-61호

「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제32조 및 같은 법 시행규칙 제26조의 규정에 의한 「예방접종의 실시기준 및 방법」(보건복지부 고시 제2014-19호, 2014. 1. 28)을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2014년 4월 25일

보건복지부장관

「예방접종의 실시기준 및 방법」 일부개정

예방접종의 실시기준 및 방법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 제1호 중 “법 제24조제1항의 제1호 내지 제11호에 규정된”을 “법 제24조제1항의 제1호 내지 제12호에 규정된”으로 하고, “일본뇌염”을 “일본뇌염, b형헤모필루스인플루엔자”로 한다.

제2조 제2호 중 “법 제24조제1항제12호에 따라”를 “법 제24조제1항제13호에 따라”로 하며 “신증후군출혈열, b형헤모필루스인플루엔자”를 “신증후군출혈열”로 한다.

별표 1 중 ⑥ 일본뇌염란, ⑪ b형헤모필루스인플루엔자란 및 ⑫ 폐렴구균란은 각각 다음과 같이 한다.

⑥ 일본뇌염

- 접종대상
 - 모든 영유아를 대상으로 한다.
- 표준접종시기
 - 쥐 뇌조직 유래 불활성화 백신은 생후 12~23개월 중 7~30일 간격으로 2회 접종한 후, 12개월 뒤에 1회 더 접종하여 기초접종을 완료하고, 만 6세와 만12세에 2회 추가 접종할 것을 권장한다.
 - 햄스터 신장세포 유래 약독화 생백신은 생후 12~23개월에 1회 접종하고, 12개월 후 2차 접종할 것을 권장한다.

⑪ b형헤모필루스인플루엔자

- 접종대상
 - (현행과 같음)
- 표준접종시기
 - (현행과 같음)
 - (현행과 같음)

⑫ 폐렴구균

- 접종대상
 - 모든 영유아를 대상으로 한다.
 - 65세 이상 노인을 대상으로 접종할 것을 권장한다.
- 표준접종시기
 - 영유아의 경우 폐렴구균 단백결합 백신으로 생후 2개월, 4개월, 6개월에 3회 기초접종을 실시하고, 생후 12~15개월에 1회 추가접종 할 것을 권장한다.
 - 65세 이상 노인은 폐렴구균 다당질 백신으로 1회 접종할 것을 권장한다.

부 칙

이 고시는 2014년 5월 1일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
<p>제2조(적용대상)</p> <p>1. 법 제24조제1항의 제1호 내지 제11호에 규정된 디프테리아, 폴리오, 백일해, 홍역, 파상풍, 결핵, B형간염, 유행성이하선염, 풍진, 수두, 일본뇌염 <추 가></p> <p>2. 법 제24조제1항제12호에 따라 「정기예방접종이 필요한 감염병 지정」 제1조에 규정된 장티푸스, 인플루엔자, 신증후군출혈열, <u>b형헤모필루스인플루엔자</u>, 폐렴구균</p> <p>[별표 1]</p> <p>⑥ 일본뇌염</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 접종대상 <ul style="list-style-type: none"> • 모든 영유아를 대상으로 한다. ○ 표준접종시기 <ul style="list-style-type: none"> • <u>사백신</u>은 생후 12~23개월 중 7~30일 간격으로 2회 접종한 후, 12개월 뒤에 1회 더 접종하여 기초접종을 완료하고, 만6세와 만12세에 2회 추가 접종할 것을 권장한다. • <u>생백신</u>은 생후 12~23개월에 1회 접종하고, 12개월 후 2차 접종할 것을 권장한다. </div>	<p>제2조(적용대상)</p> <p>1. ----- <u>제12호</u>----- ----- ----- -----<u>b형헤모필루스</u> <u>인플루엔자</u></p> <p>2. -----<u>제13호</u>----- ----- ----- ----- ----- <u><삭 제></u> ----- -----</p> <p>[별표 1]</p> <p>⑥ 일본뇌염</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 접종대상 <ul style="list-style-type: none"> • 모든 영유아를 대상으로 한다. ○ 표준접종시기 <ul style="list-style-type: none"> • <u>취 뇌조직 유래 불활성화 백신</u>은 생후 12~23개월 중 7~30일 간격으로 2회 접종한 후, 12개월 뒤에 1회 더 접종하여 기초접종을 완료하고, 만 6세와 만12세에 2회 추가 접종할 것을 권장한다. • <u>햄스터 신장세포 유래 약독화 생백신</u>은 생후 12~23개월에 1회 접종하고, 12개월 후 2차 접종할 것을 권장한다. </div>

⑪ b형 헤모필루스인플루엔자

- 접종대상
 - (생략)
- 표준접종시기
 - (생략)
 - (생략)

※ 표준접종일정

구 분	표준접종시기	접종 간격	백신종류	
기초 접종	1차	생후 2개월	최소한 생후 6주 이후	PRP-T HbOC
	2차	생후 4개월	1차 접종후 4~8주 경과 후	PRP-T HbOC
	3차	생후 6개월	2차 접종후 4~8주 경과 후	PRP-T HbOC
추가 접종	4차	생후 12~15개월	3차 접종후 최소 8주 이상 경과 후	PRP-T HbOC

⑪ b형 헤모필루스인플루엔자

- 접종대상
 - (현행과 같음)
- 표준접종시기
 - (현행과 같음)
 - (현행과 같음)

<삭 제>

⑫ 폐렴구균

- 접종대상
 - <신 설>
 - 65세 이상 노인을 대상으로 접종할 것을 권장한다.
- 표준접종시기
 - <신 설>
 - 65세 이후 1회 접종한다. 단, 65세 이전에 23가 다당질 백신을 접종받은 사람은 마지막 접종일로부터 5년 경과 후 1회 접종한다.
- 백신종류
 - 23가 다당질 백신(PPSV23)

⑫ 폐렴구균

- 접종대상
 - 모든 영유아를 대상으로 한다.
 - (현행과 같음)
- 표준접종시기
 - 영유아의 경우 폐렴구균 단백결합 백신으로 생후 2개월, 4개월, 6개월에 3회 기초접종을 실시하고, 생후 12~15개월에 1회 추가접종 할 것을 권장한다.
 - 65세 이상 노인은 폐렴구균 다당질 백신으로 1회 접종할 것을 권장한다.

<삭 제>

< 소관 부서명 >

보건복지부 질병정책과	
연 락 처	(044) 202-2505